

Condylox (Podofilox)

What is Condylox?

Condyloma acuminata is a clear liquid that is made of a type of acid. It is used to treat genital warts. Condyloma acuminata destroys the wart tissue. The wart will change from a fleshy skin color to a dry, crusted, dead appearance and then go away.

How do I use Condylox?

1. Open the bottle carefully and dip one cotton applicator tip in the medicine. The applicator tip should be damp, with no medicine dripping from the tip. Drain any extra liquid from the applicator by pressing it against the inside of the bottle. Close the bottle tightly.
 2. Put Condylox only on those areas that your nurse or doctor has shown you. The applicator with the medicine on it should be touched to the wart being treated, then thrown away. Do not get Condylox on normal skin. Use a fresh applicator for each application.
 3. Let Condylox dry completely before your clothes touch the area. Wash hands well with soap and water after using Condylox.
 4. Do not wash Condylox off once it is applied.
 5. Apply Condylox once in the morning and once at night for three days in a row. Then stop using Condylox for four days. This is a Condylox treatment week.
 6. After four days of not using Condylox, start applying Condylox again once in the morning and once at night for three days. Then stop using it again for four days.
 7. Repeat this treatment week (twice a day for three days followed by four days with no treatment) until there is no wart remaining, up to a total of four weeks. If the warts have not gone away after four treatment weeks, stop using Condylox and call your doctor or nurse.
 8. Do not apply Condylox more often than three days in a row. Using Condylox more often will not make it work better and may cause side effects.

What are the side effects of Condylox?

Along with its needed effects, a medicine may cause some unwanted effects. Although not all of these side effects may occur with Condylox, if they do occur they may need medical attention.

Get emergency help immediately if any of the following side effects occur:

In addition to the side effects mentioned above, check with your doctor or nurse if any of the following side effects occur:

* Nausea/vomiting * Unusual tiredness or weakness * Dizziness * Fever * Diarrhea

* Less than usual amount of urine

Stop using Condylox and check with your doctor or nurse if any of the following occur:

*** Bleeding, swelling, burning, itching or pain around the area being treated**

Other side effects not listed above may also occur in some people. If you notice any other effects check with your doctor or nurse.

What should I tell the nurse or doctor before I use Condylox?

To decide on the best treatment for your infection, your nurse or doctor should be told:

1. If the area of your skin that is to be treated is red, irritated, bleeding, swollen, or painful.
 2. If you are pregnant.
 3. If you are breastfeeding.

What precautions should I take while using Condylox?

1. Condylox should only be used on genital warts on the outside of your body. Do not use Condylox on genital warts that are on the inside of your body. Also, do not sue Condylox on any other kinds of warts or on any other skin growths.
 2. As the wart begins to die, you may feel a little burning when Condylox is used on the wart. The area may also get a little red and sore. These usually go away in about a week after treatment is stopped. If any of the local effects bother you too much, stop using Condylox and call your doctor or nurse.
 3. If you notice that the treated area is bleeding or swollen, or if there is pain, burning, or itching that is bothering you a lot, stop using Condylox and call your nurse or doctor.
 4. If you get Condylox on the skin, wash it off immediately with soap and water.
 5. Do not get Condylox in your eyes. If Condylox does get in your eyes, flush eye immediately with water and call your doctor.
 6. Genital warts can be spread to another person by sex. Use a condom or do not have sex until the warts are completely gone.
 7. Do not have sex during the three days you are using Condylox.
 8. Women should not get pregnant while using Condylox since Condylox may be harmful to an unborn baby.
 9. Keep the bottle tightly closed and in an upright position.
 10. Keep this medicine out of the reach of children.

For more information, call the clinic:



South Carolina Department of Health
and Environmental Control

ML-013117 11/06

Condylox (Podofilox)

¿Qué es Condylox?

Condylox es un líquido de color claro que es hecho de un tipo de ácido. Es usado para tratar las verrugas genitales. Condylox destruye el tejido de las verrugas. Las verrugas cambiarán del color carne a una apariencia de una costra seca, muerta y luego desaparecen.

¿Cómo debo de usar Condylox?

1. Abra la botella cuidadosamente y moje la punta del aplicador de algodón en la medicina. La punta del aplicador debe de estar mojado, seque el exceso de líquido del aplicador, presionándolo contra la parte interna de la botella. Cierre bien la botella.
2. Ponga el Condylox solamente en las áreas que su enfermera o doctor le mostró. El aplicador con el medicamento debe de tocar las áreas de las verrugas que han empezado a ser tratadas, luego tírelo a la basura. No ponga Condylox en la piel normal. En cada aplicación use un nuevo aplicador.
3. Deje que Condylox se seque completamente antes de que su ropa toque el área. Lave bien sus manos con agua y jabón después de utilizar Condylox.
4. No lave Condylox una vez que se lo haya aplicado.
5. Aplique Condylox una vez por la mañana y una vez por la noche, por tres días seguidos. Luego deje de usar Condylox por cuatro días. Este es el tratamiento semanal de Condylox.
6. Después de no usar Condylox por cuatro días, empiece a utilizarlo otra vez, una vez en la mañana y otra vez por la noche, por tres días seguidos. Luego deje de usarlo por cuatro días.
7. Repita este tratamiento semanalmente por hasta un total de cuatro semanas (dos veces al día por tres días seguidos, dejándolo de usar por cuatro días) hasta que ya no haya ninguna verruga. Si las verrugas todavía no se han quitado después del tratamiento de las cuatro semanas, pare de usar Condylox y llame a su doctor o enfermera.
8. No use Condylox más de tres días seguidos. Usarlo más de lo recomendado no hará que Condylox trabaje mejor y puede causar efectos secundarios.

¿Cuáles son los efectos secundarios de usar Condylox?

Conjuntamente con los efectos deseados, este medicamento puede causar otros efectos indeseados. Aunque no todos estos efectos secundarios pueden ocurrir con Condylox, si ocurren pueden necesitar atención médica.

Si alguno de los efectos secundarios ocurre, pida ayuda médica inmediatamente:

* Dificultad para respirar * Pérdida de la conciencia * Ataques * Dificultad para ver

En adición a los efectos mencionados anteriormente, consulte con su doctor o enfermera, si cualquiera de los siguientes efectos secundarios ocurre:

* Náusea/vómitos * Cansancio o debilidad repentina * Mareos * Diarrea * Fiebre
* Menos cantidad de orina de lo usual

Si cualquiera de lo siguiente ocurre, deje de usar Condylox y consulte con su doctor o enfermera:

* Sangrado, hinchazón, ardor, picazón o dolor alrededor del área tratada.

Algunos otros efectos no listados anteriormente pueden ocurrirle a algunas personas. Si usted nota cualquier otro efecto, consulte con su doctor o enfermera.

Antes de usar Condylox, ¿Qué debo decirle a la enfermera o doctor?

Para decidir cual es el mejor tratamiento para su infección, usted debe decirle a su enfermera o doctor:

1. Si el área de su piel que está siendo tratada está roja, irritada, sangrando, hinchada o con dolor.
2. Si usted está embarazada.
3. Si usted está amamantando.

¿Qué precauciones debo de tomar si estoy usando Condylox?

1. Condylox debe de ser usado contra las verrugas genitales que se encuentran en la parte externa de su cuerpo. No use Condylox contra las verrugas genitales que se encuentran en la parte interna de su cuerpo. También, no utilice Condylox en ninguna otra clase de verrugas o en ningun otro bulto en su piel.
2. Mientras las verrugas empiezan a morir, usted puede sentir un poco de ardor al usar Condylox en la verrugas. El área puede que también se ponga un poco roja e hinchada. Esto normalmente desaparece una semana después de haber dejado de usar el tratamiento. Si alguno de los efectos locales le molestan demasiado. Deje de utilizar Condylox y llame a su doctor o enfermera.
3. Si usted nota que el área tratada está hinchada y sangrando o si tiene dolor o picazón que le molesta demasiado, deje de utilizar Condylox y llame a su enfermera o doctor.
4. Si Condylox cae en su piel, lávela inmediatamente con agua y jabón.
5. Si Condylox entra en sus ojos. Lave sus ojos inmediatamente con agua y llame a su doctor.
6. Las verrugas genitales pueden propagarse por medio de las relaciones sexuales. Use un condón o no tenga relaciones sexuales, hasta que las verrugas se hayan quitado completamente.
7. No tenga relaciones sexuales durante los tres días que usted está usando Condylox.
8. Las mujeres no deberían embarazarse mientras están usando Condylox, ya que Condylox puede dañar al nonato.
9. Mantenga la botella cerrada y en una posición vertical.
10. Mantenga esta medicina fuera del alcance de los niños.

Para más información, llame a la clínica: